

Консультация для воспитателей.

Ребенок после операции по устранению косоглазия.

При наличии выраженного нарушения работы глазодвигательных мышц у детей им рекомендован оперативный способ избавления от данной проблемы.

Оптимальный возраст для проведения коррекции шестой год. К этому времени становится ясна степень нарушения зрительной функции, а ребёнок может активно участвовать в послеоперационной реабилитации.

В стандартной схеме лечения будут присутствовать следующие этапы:

- + Предоперационная подготовка. Включает в себя все методы коррекции, которые предписаны офтальмологом в зависимости от типа нарушения. Аппаратные, очковые методики, гимнастика могут быть предписаны на срок от 6 и более месяцев перед назначением операции.
- + Лечение сопутствующих заболеваний: инфекций, амблиопии, коррекция дальнозоркости и близорукости, а также других офтальмологических нарушений.
- + Зрительные функции должны удовлетворять некоторым требованиям, в противном случае операция бессмысленна до 10-12 лет.
- + Подготовка за несколько дней до операции: прохождение осмотра у назначенных специалистов, ЭКГ, анализ крови.
- + Сама операция. Проводится под общим наркозом, на одном или двух глазах и длится от 30 минут до нескольких часов.
- + Послеоперационный период восстановления. Его тяжесть и длительность зависят от травматичности процедуры, используемого инструмента, личных особенностей организма пациента.



Несколько недель после операции применяют специальные противовоспалительные капли и (по необходимости) антигистаминные препараты. Глаз будет покрасневшим и отекишим. Пару дней глаз будет сильно слезиться и болеть, также будет казаться, что в глазу есть соринки. Швы самостоятельно рассасываются по истечении 6 недель.

В течение месяца после оперативного вмешательства нужно бережно охранять глаз. На протяжении всего этого периода следует соблюдать правила предосторожности: отказаться от занятий физическими упражнениями, от повышенных нагрузок, не тереть глаза, избегать пребывания в запыленных и задымленных помещениях. Детей на полгода освобождают от физкультуры.

Обычно ребёнок быстро восстанавливается и физически, и психологически: устранение видимого дефекта улучшает самооценку, а болезненные ощущения от проведённого вмешательства забываются.

Окончательная оценка положения глаз проводится через 2-3 месяца.

После операции требуется не менее 12 месяцев для формирования бинокулярного зрения и закрепления эффекта операции.

Подготовил учитель-дефектолог Н.В. Сурикова